

Bevezető analízis 2 előadás

Osztatlan matematikatanár szak 2. félév, 2019. tavasz

3. előadás (február 25.)

Az óra teljes egészén a valós számok axiómáit tárgyaltuk. Először megbeszéltük, hogy mit jelent a konstruktív megalapozás: megkonstruáljuk a valós számokat, például legyenek végtelen tizedestörtek, de ekkor definiálnunk kell közöttük a műveleteket és a rendezést. Mi ehelyett az axiomatikus felépítést választjuk: nem törődünk azzal, hogy mik a valós számok, csak a tulajdonságaik érdekelnek. Elvárjuk, hogy eleget tegyenek bizonyos szabályoknak (axiómák). Természetesen itt is jogosan vetődik fel, hogy van-e olyan struktúra, amely kielégíti az általunk kirótt szabályokat. Felírtam az axiómák négy „csoportját” (test, rendezési, arkhimédészi és Cantor).

A testaxiómák a valós számok algebrai tulajdonságait rögzítik. Adott két művelet, az összeadás és szorzás. Az összeadásra a következőket írjuk elő: kommutativitás, asszociativitás, nullelem létezése és ellentett elem létezése. A szorzás esetében ugyancsak megkívánjuk a kommutativitást, asszociativitást, ezenkívül a nullelemtől különböző egységelem létezését, illetve a nullelem kivételével a reciprok létezését. Az összeadást és szorzást a disztributivitás axiómája kapcsolja össze. Az olyan struktúrákat, amelyekben mindez a 9 axióma teljesül, testeknek szokás hívni. Megjegyeztem, hogy a $\{0, 1\}$ halmaz modulo 2 műveletekkel test, de például $\{0, 1, 2, 3\}$ halmaz a szokásos modulo 4 műveletekkel nem test (a 2-nek nincs reciproka).

Ezután megbeszéltük az axiómák néhány következményét, többek között azt, hogy a nullelem, az ellentett és a reciprok egyértelmű (előbbi kettőt be is láttuk), amelyeket szokás szerint $-a$ és $\frac{1}{a}$ fogja jelölni. Ezenkívül beláttuk, hogy $a \cdot 0 = 0$, majd házinak adtam fel azt, hogy $(-1) \cdot a = -a$ minden a -ra.

Ezt követően a rendezési axiómákra térünk rá. Bevezettük az $a < b$ relációt, és erre előírtuk a trichotómiát, tranzitivitást, valamint összekapcsoltuk az összeadás és szorzás műveletével ($a < b \implies a + c < b + c$, illetve $(a < b) \wedge (0 < c) \implies ac < bc$). (Meséltem arról, hogy a kő-papír-olló játék valójában egy nem tranzitív rendezés.) A rendezés segítségével bevezethetjük a pozitív, negatív szám elnevezéseket. Használhatjuk továbbá az $a > b$, $a \leq b$, $a \geq b$ jelöléseket is. Értelmezhetjük ezenkívül a nyílt, zárt, egyik oldalról nyílt, másíkról zárt intervallumokat, a nyílt, zárt félegyeneseket. Megemlítettem az elfajuló intervallumokat is.

Bevezettük ezután az abszolútérték fogalmát, és felírtam a főbb tulajdonságait (ezek végiggondolását házinak adtam: csupán a definíciót kell alkalmazni némi esetszétválasztással). Kimondtam a háromszög-egyenlőtlenség klasszikus változatát ($|a + b| \leq |a| + |b|$), valamint egy másik változatát ($||a| - |b|| \leq |a - b|$). A bizonyítást gyakorlatra hagytam.

Tételként igazoltam, hogy $0 < 1$. Ennek következménye, hogy $1 + 1 + \dots + 1$ mind különböző, és ezek halmazát neveztem pozitív egészeknek, amelyet \mathbb{N}^+ -szal jelöltem. Az egész számok halmaz ebből a 0 és az ellentett elemek hozzávételével kapható, jelölése \mathbb{Z} . A p/q alakú számok halmazát, ahol p, q egészek és $q \neq 0$, a racionális számok halmazának nevezzük, jelölése \mathbb{Q} .

Következett az arkhimédészi axióma (minden valós számnál van nagyobb pozitív egész szám), amely az előzőekből nem vezethető le (de nem könnyű példát találni, erről meséltem picit). Alkalmazásként kimondtam, hogy bármely két különböző valós szám között van racionális szám. A bizonyítás ötletét teljesen kitérgyaltuk, de a leírás a következő órára maradt.